



“足三里”和“三阴交”单穴与组穴电针刺激对肠易激综合征干预效应的比较研究



注:A为转棒测试示意图,B、C分别为空白组与模型组小鼠的跌落时间、跌落时转棒速度,D为腹部机械痛敏测试示意图,E、F、G分别为末次给药后第1天、第7天、第14天各组小鼠腹部机械痛敏阳性反应次数。与同时点空白组相比,* $P<0.05$,** $P<0.01$,*** $P<0.001$;与模型组基线相比,## $P<0.01$ 。

附图1 肠易激综合征小鼠模型的建立评估($\bar{x}\pm s_x$, 11~12只鼠/组)

Appendix Fig. 1 Establishment and evaluation of irritable bowel syndrome mouse model ($\bar{x}\pm s_x$, 11—12 mice/group)



注：A为模型组相对空白组有显著差异的动作姿态指标，B、C、D分别为各组小鼠嗅探、水平运动和站立在完整测试的30 min、前15 min、后15 min的时间占比，E、F分别为三阴交组和足三里组相较于模型组的行为转换网络。与空白组比较，* $P < 0.05$ ，** $P < 0.01$ ，*** $P < 0.001$ ；与模型组比较，# $P < 0.05$ ，## $P < 0.01$ 。

附图2 肠易激综合征模型小鼠动作姿态特征及针刺对动作状态转换的矫正(7~8只鼠/组)

Appendix Fig. 2 Characteristics of movement postures in irritable bowel syndrome model mice and the correction of behavioral state transitions by acupuncture (7—8 mice/group)